

Cos'è OP Test

OP Test permette uno **screening della cavità orale e dell'orofaringe** in soggetti senza apparenti lesioni (o con lesioni di aspetto innocente) per identificare lesioni precancerose prima che diventino pericolose.

Grazie a questo Test, la prevenzione del carcinoma della cavità orale e di tutta una serie di patologie che possono svilupparsi nella zona della bocca può essere fatta direttamente dall'odontoiatra in maniera precoce, semplice e indolore.

Perché fare questo test ?

- L'**attività di screening** può abbattere il tasso di mortalità legato a questa patologia e prevenire interventi con conseguenze anche invalidanti.
- Non esistono sistemi efficaci di diagnosi preventiva quando le lesioni nel cavo orale non sono visibili: l'**attività di screening** diventa quindi fondamentale, non richiede metodi invasivi ed è estremamente semplice.
- Il cancro orale è una patologia che ha un'**incidenza elevata** e che oggi coinvolge un numero rilevante di persone.

OP
test

www.testprevenzioneorale.com

Chi può sottoporsi al test

Il test può essere associato al normale controllo di routine dell'odontoiatra per un'**attività completa di screening**.

Nel caso di presenza nel cavo orale di lesioni sospette che devono essere approfondite è utile effettuare subito OP Test per avere un'analisi completa ed esaustiva, in modo da attivare eventuali follow-up medici.

Il carcinoma del cavo orale

Alcune volte macchie di aspetto innocente possono essere **l'espressione di lesioni pre-tumorali o, nella peggiore delle ipotesi, tumorali**. In altri casi questo tipo di patologia può anche svilupparsi partendo da tessuti apparentemente normali.

L'incidenza del cancro orale in Italia è elevata, dato che ogni anno vengono diagnosticati **circa 4.500 casi e si registrano circa 3.000 decessi**: dati più alti di quelli che riguardano il carcinoma della cervice uterina.

Come si effettua il test ?

Per fare il Test è sufficiente che l'odontoiatra passi un semplice tampone nel cavo orale. Il materiale cellulare raccolto viene sottoposto ad analisi citologica e ricerca di HPV (ad alto rischio) per evidenziare eventuali anomalie o patologie sospette.

I fattori di rischio

Vari sono i **fattori di rischio che possono favorire l'insorgenza di tumori nel cavo orale** come ad esempio fumo, abuso di alcol, scarsa igiene orale, infezione da HPV legata a rapporti sessuali orali, microtraumi o lesioni croniche della mucosa della bocca, l'eccessiva esposizione al sole (carcinoma del labbro) e una dieta povera di frutta e verdura.